



LE DÉPISTAGE ET LE DIAGNOSTIC DE LA COVID-19 CHEZ LES PERSONNES TRANSGENRES ET NON BINAIRES AU CANADA

L'étude

À l'automne 2019, Trans PULSE Canada a mené une enquête pancanadienne auprès de 2873 personnes trans et non binaires âgées de 14 ans et plus, dont 1184 ont consenti à être recontactées pour de futures recherches. Parmi ces personnes, 820 ont participé à une enquête en ligne en lien à la COVID réalisée en anglais ou en français en septembre / octobre 2020. Les données ont été pondérées afin de représenter l'échantillon complet de 2019, avec des intervalles de confiance de 95 % utilisés pour démontrer une étendue de valeurs probables car nous n'avons pas été en mesure d'enquêter auprès de toutes les personnes trans et non binaires au Canada. Les résultats de l'échantillon complet sont présentés ici; notre équipe développe [un tableau de bord de données](#) en ligne dont les résultats peuvent être personnalisés pour différents sous-groupes ou intersections, et ce, car les impacts de la pandémie peuvent varier en fonction des groupes.

Les résultats

Plus d'un tiers (37,8 %) des répondants ont subi un test de dépistage de la COVID-19, dont 0,5 % étaient porteurs du virus. Bien que la proportion de répondants ayant reçu un résultat positif à la COVID-19 était petite, 15,0 % d'entre eux soupçonnaient avoir éprouvé des symptômes liés à la COVID-19 à un moment donné depuis le 12 mars 2020 (le début de la pandémie). Environ un répondant sur dix (9,4 %) avait évité de se faire dépister ou soigner pour la COVID-19 lorsqu'il jugeait cela nécessaire, dont environ 40 % ont indiqué avoir pris cette décision par crainte de vivre une discrimination. Parmi ceux qui avaient eu ou voulaient avoir accès au dépistage ou aux soins liés à la COVID-19, 10,8 % ont déclaré avoir été victimes de discrimination en sollicitant ces services. La majorité étaient très (73,1 %) ou plutôt (16,6 %) susceptibles de se faire vacciner contre la COVID-19 lorsque le vaccin sera disponible.

Les implications

En date de novembre, [27 % des Canadiens avaient subi un test de dépistage de la COVID-19, dont 2,6 % étaient porteurs du virus](#). Nos résultats témoignent d'un grand recours aux tests de dépistage parmi les répondants trans et non binaires (37,8 %) malgré [les obstacles aux soins de santé](#), et ce, même dans les situations d'urgence. Le fait qu'une petite proportion des personnes testées étaient positives à la COVID-19 (0,5 %) suggère que les personnes trans et non binaires présentant un risque d'infection moins élevé cherchaient également à se faire dépister.

Une approche proactive de la prévention de la COVID-19 se traduit également par une volonté élevée de vouloir se faire vacciner : près des trois quarts des répondants ont déclaré qu'ils étaient très susceptibles de décider de se faire vacciner. En comparaison, à la fin de septembre, [39 % des Canadiens ont déclaré vouloir se faire vacciner](#) dès qu'un vaccin serait mis sur le marché. Néanmoins, ces résultats indiquent que les personnes trans et non binaires font face à des obstacles spécifiques au dépistage et aux soins de la COVID-19, et éprouvent parfois de la discrimination lorsqu'elles accèdent vraiment à ces services. Alors que nous entrons dans la « troisième vague » de la pandémie de la COVID-19, il est essentiel que les tests de dépistage et les soins inclusifs des réalités trans et non binaires soient disponibles partout au Canada.

	%	95% CI ^a
Test de dépistage pour la COVID-19 (écouvillon)	37,8	(34,3, 41,4)
Résultat positif à la COVID-19 chez les personnes dépistées ^b	0,5	(0,0, 1,2)
Croyait avoir des symptômes de la COVID-19		
Oui	15,0	(12,3, 17,6)
Non	65,8	(62,2, 69,3)
Aucune idée	19,3	(16,3, 22,2)
Voulait se faire dépister, mais cela n'était pas possible	10,3	(8,1, 12,6)
Évitait le dépistage/les soins alors que c'était nécessaire	9,4	(7,2, 11,6)
Vécu de discrimination en lien au dépistage/aux soins ^c	10,8	(7,0, 14,5)
Évitait de se faire dépister si des symptômes apparaissent ^d		
Oui	5,6	(3,7, 7,5)
Non	82,7	(79,6, 85,7)
Aucune idée	11,7	(9,1, 14,2)
Probabilité de choisir de se faire vacciner contre la COVID-19		
Très probable	73,1	(69,7, 76,5)
Plutôt probable	16,6	(13,8, 19,4)
Plutôt improbable	2,8	(1,5, 4,1)
Très improbable	2,6	(1,3, 3,9)
Aucune idée	4,9	(3,2, 6,6)

a Intervalle de confiance de 95 %

b Parmi les personnes dépistées qui signalaient un diagnostic (n = 316)

c Parmi les personnes qui ont accédé ou voulaient accéder aux services (n = 367)

d Parmi les personnes qui ne présentaient pas de symptômes (n=694)

« [J'ai évité le dépistage ou les soins en lien à la COVID-19 car] j'avais déjà vécu de la discrimination transphobe dans les soins de santé, et une visite préalable concernant le dépistage ou les soins en lien à la COVID-19 a été compliquée en raison de la confusion entourant mon genre. »